

# ROYAL BLUE

Miscuglio verde scuro a tessitura medio-fine per zone a clima caldo-continentale (areale climatico italiano), adatto anche per le aree litoranee, studiato e formulato per qualsiasi tipo di terreno. Miscela con grandi performances anche all'ombra, fino al 50% in meno della luce diretta. Prodotto costituito da cultivar americane di ultima generazione. Tappeto che a piena maturità, si presenta con elevata densità, uniformità e basse richieste manutentive. Tollerante alla Macchia bruna estiva. Ideale per la costruzione di tappeti erbosi ricreazionali di piccole o grandi dimensioni; da consigliare anche per l'impiego ad uso sportivo, tipo Campi da Rugby.



Sacco da 10 Kg

## Composizione:

% in peso	Specie & Cultivar
60%	Festuca arundinacea TPC/Rockwell
30%	Festuca arundinacea Rebounder
10%	Poa pratense Comet

## Consigli Tecnici

<b>Terreno</b>	profondo, drenante, di medio impasto, ma anche argilloso e/o sciolto, con pH che può spaziare dall'alcalinità fino alla sub-acidità
<b>Periodo di semina</b>	da Marzo a Ottobre (saltando i mesi di massimo caldo estivo). Il miscuglio impiega da 4 a 10 gg a germinare in considerazione della temperatura dei terreni (temperatura del suolo superiore ai 12°C)
<b>Dosaggio Consigliato</b>	40-50 gr/mq. Le dosi massime sono consigliate in caso di semine tardive e/o non perfetta lavorazione del letto di semina.
<b>Taglio</b>	eseguire il primo taglio quando il tappeto ha raggiunto i 6 cm e portarlo subito a 4 cm, in modo che non pregiudichi la germinazione della Poa pratensis. Non asportare mai oltre il 30% della vegetazione presente. Non scendere sotto i 40 mm. Con gestione dello sfalcio sopra i 60 mm, il tappeto diventa più grossolano, con tessitura fogliare più marcata. Per altezze di taglio sotto i 35 mm è consigliabile l'uso di macchine elicoidali.
<b>Nutrizione</b>	concimazione fosfatica alla semina per poi gestire il tappeto a maturità con 25 unità di Azoto mq/annui, scegliendo fertilizzanti specifici per tappeti erbosi (Azoto a rilascio programmato). Intervenire con almeno 4 fertilizzazioni annuali
<b>Irrigazione</b>	all'impianto tenere il letto di semina costantemente umido per non arrestare il processo di germinazione. Nel periodo estivo irrigare con 10 mm ogni 2-3 gg, avendo cura di non esagerare con l'acqua per non favorire le malattie stagionali. In caso di ombra da conifere (pini, abeti, ecc.) raddoppiare i tempi di bagnatura nei periodi più caldi
<b>Fitostimolazione</b>	programmare almeno 2 trattamenti biostimolanti tra Luglio e Agosto per aumentare la tolleranza al caldo e al calpestio.
<b>Rigenerazione</b>	impiegare lo stesso miscuglio oppure Royal Park per la rigenerazione di fine estate e/o di uscita dall'inverno, eseguendo un leggero verticut con asporto del feltro e successiva distribuzione di circa 40-50 gr/mq di Royal Blue o Royal Park per rinfoltire la vegetazione. Concimare poi con Biostart P 12.20.15 alle indicazioni d'etichetta

## Epoca di semina

